



临床执业（含助理）医师笔试

考前（临床） 100 题



多看一题



多考一分

主编 方正医考教研室

方正教育
FZ EDUCATION



扫码获取分校联系方式



关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

临床执业（含助理）医师资格考试

考前 100 题

1. 男，68 岁。活动后气短 3 年，吸烟 30 年，30 支/天。查体：心肺未见异常。肺功能： $FEV_1/FVC62\%$ ， FEV_1 占预计值 65% 。吸入沙丁胺醇 15 分钟后复查肺功能 FEV_1 改善率 4% ，绝对值增加 $60ml$ 。最可能的诊断是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 左心衰竭
- C. 支气管哮喘
- D. 间质性肺疾病
- E. 睡眠呼吸暂停综合征

方正医学网答案：A

2. 女，24 岁，间断憋喘 10 天，加重 2 天来就诊。给予糖皮质激素、 β_2 受体激动剂、氨茶碱治疗后有好转，出院后肺功能检查正常。对于该患者的长期治疗，首选

- A. 吸入激素联合吸入长效 β_2 受体激动剂
- B. 短效 β_2 受体激动剂

C. 长效 M 受体激动剂

D. 口服糖皮质激素

E. 口服糖皮质激素联合长效 β_2 受体激动剂

方正医学网答案：A

3. 男，26 岁，车祸外伤 3 小时。查体：BP80/50mmHg，P130 次/分，R32 次/分。气管右移，左侧胸部饱满，左侧胸部皮肤捻发感，左侧肺呼吸音消失。胸部 X 线示左肺完全塌陷。考虑诊断为

- A. 左侧闭合性气胸
- B. 左侧张力性气胸
- C. 左侧开放性气胸
- D. 左侧肺部裂伤
- E. 左侧血胸

方正医学网答案：B

4. 女，30 岁。活动后心悸、气短 2 年，1 周前受凉后出现咳嗽、咳白痰。有风湿性心脏病二尖

瓣狭窄史。查体：高枕卧位，BP90/60mmHg，双肺底可闻及较密的细湿啰音，心率 140 次/分，心律绝对不齐， S_1 强弱不一。

治疗首选

- A. 西地兰
- B. 青霉素
- C. 硝普钠
- D. 美托洛尔
- E. 多巴酚丁胺

方正医学网答案：A

5. 治疗室上性心动过速的药物首选

- A. 胺碘酮
- B. 利多卡因
- C. 腺苷
- D. 美托洛尔
- E. 维拉帕米

方正医学网答案：C

6. 男，68 岁。活动后心悸气短 4 年，突发喘憋 1 小时来诊。高血压病史 10 年余，平时血压波动于 130~150/70~90mmHg。查体：BP230/100mmHg，端坐位，双肺底可闻及少许湿啰音，心

率 114 次/分。最适宜治疗是

- A. 口服硝苯地平
- B. 口服阿替洛尔
- C. 肌肉注射利血平
- D. 口服哌唑嗪
- E. 静脉滴注硝普钠

方正医学网答案：E

7. 男，50 岁。3 周来反复出现上 3 层楼时胸痛，为闷痛，休息 3min 能缓解，不剧烈运动则无症状，诊断为心绞痛。最可能的心绞痛临床类型是

- A. 初发劳力型
- B. 恶化劳力型
- C. 自发型
- D. 变异型
- E. 稳定型

方正医学网答案：A

8. 男，12 岁。活动时眼前发黑 1 年。查体：BP100/60mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，心率 55 次/分，律齐。胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及收缩期喷射性杂音。超声心动图显示室间隔不对称性肥厚，最厚处

20mm, 左室舒张功能障碍。最可能的诊断是

- A. 梗阻型肥厚型心肌病
- B. 非梗阻型肥厚型心肌病
- C. 室间隔缺损
- D. 主动脉瓣重度狭窄
- E. 扩张型心肌病

方正医学网答案: A

9. 女, 35 岁。乏力、面色苍白 1 月余。血常规: Hb86g/L, WBC $3.6 \times 10^9/L$, Plt $360 \times 10^9/L$, MCV72f1, MCHC28%, Ret0.014。给予口服铁剂治疗 1 周时可出现的血液指标变化是

- A. MCHC 上升
- B. WBC 上升
- C. Ret 上升
- D. RBC 上升
- E. Plt 上升

方正医学网答案: C

10. 男, 24 岁, 牙龈出血 1 周。骨髓细胞学检查: 增生极度活跃, 原始淋巴细胞 0.72, 行 VDLP 方案化疗 14 天后体温 37.4℃。复查血常规: Hb75g/L, WBC1.4

$\times 10^9/L$, 分类 N0.10, L0.90, Plt $30 \times 10^9/L$ 。目前首选治疗是

- A. 输注悬浮红细胞
- B. 应用抗生素控制感染
- C. 输注新鲜血浆
- D. 输注浓缩血小板
- E. 皮下注射 G-CSF

方正医学网答案: E

11. 女, 25 岁。溢乳并继发性闭经 1 年。无孕产史。妇科检查未见异常。实验室检查: 血 PRL 升高。蝶鞍 MRI 发现垂体微腺瘤。首选的治疗措施是

- A. 应用 GnRH-a
- B. 应用氯米芬
- C. 放射治疗
- D. 手术治疗
- E. 应用溴隐亭

方正医学网答案: E

12. 女, 32 岁, 心悸怕热多汗, 停经 6 周。查体: 双侧甲状腺弥漫性肿大, 有突眼。实验室检查: TT_3 、 TT_4 、 FT_3 、 FT_4 均升高, TSH 下降, TRAb 阳性。B 超提示宫内孕。下列治疗措施

中正确的是

- A. 普萘洛尔
- B. 手术
- C. ^{131}I 放疗
- D. 丙硫氧嘧啶
- E. 碘剂

方正医学网答案：D

13. 女，57 岁。20 年前曾诊断为“2 型糖尿病”，平素予“二甲双胍+格列齐特”治疗，GHbA_{1c}8%~8.5%。近 1 年来出现双眼视物模糊。眼底荧光素钠造影：双侧视网膜可见棉絮状软性渗出。视网膜病变的分期是

- A. II 期
- B. IV 期
- C. I 期
- D. V 期
- E. III 期

方正医学网答案：E

14. 女，29 岁。肥胖、头痛伴痛经 1 年。查体：BP180/110mmHg，向心性肥胖，满月脸，皮肤薄，有痤疮，腹壁有宽大紫纹，下

肢胫前凹陷性水肿。为明确库欣综合征，拟检查

- A. 血浆皮质醇
- B. 尿游离皮质醇
- C. 血皮质醇昼夜节律
- D. 小剂量地塞米松抑制试验
- E. 大剂量地塞米松抑制试验

方正医学网答案：D

15. 男，70 岁。双手指间关节疼痛 2 年，每日晨僵数分钟。查体：T36.6℃，P70 次/分，R18 次/分，BP100/70mmHg，皮肤未见皮疹，心肺腹未见异常，双手远端指间关节 Heberden 结节，双手近端指间关节骨性膨大。血沉正常，ASO(-)，RF(-)。可选择的一线治疗药物是

- A. 青霉素
- B. 秋水仙碱
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 双氯芬酸钠
- E. 甲氨蝶呤

方正医学网答案：D

16. 男，45 岁。HBsAg 阳性 10 年，乏力、纳差、尿黄 7 天。

查体：巩膜中度黄染，肝肋下 1cm，质软。实验室检查：ALT460U/L，TBil84 $\mu\text{mol/L}$ ，HBV-DNA 6.2×10^9 拷贝/ml，抗 HAVIgM(-)，抗 HEV(-)，抗 HCV(-)。最重要治疗药物是

- A. 茵栀黄口服液
- B. 利巴韦林
- C. 异甘草酸镁注射液
- D. 促肝细胞生长素
- E. 替诺福韦酯

方正医学网答案：E

17. 男，30 岁，渔民。反复发热、腹痛腹泻。查体：高热，心动过速，肝脾肿大。血常规显示红细胞、白细胞均升高，以嗜酸性粒细胞增多为主。最适宜的治疗药物是

- A. 青霉素
- B. 异烟肼
- C. 吡喹酮
- D. 环丙沙星
- E. 阿苯达唑

方正医学网答案：C

18. 咳声不扬，痰稠色黄，不易

咳出

- A. 热邪犯肺，肺津被灼
- B. 寒痰湿浊，停聚于肺
- C. 肺肾阴虚，疫毒攻喉
- D. 肺气虚损，失于宣降
- E. 痰热壅肺，气机阻滞

方正医学网答案：A

19. 脾胃之气的运动特点是

- A. 胃主受纳，脾主运化
- B. 脾喜燥恶湿，胃喜润恶燥
- C. 脾气主升，胃气主降
- D. 脾为湿土，胃为燥土
- E. 脾属太阴，胃属阳明

方正医学网答案：C

20. 久病面色苍白，却时而泛红如妆，游移不定者，其

- A. 阴虚证
- B. 实热证
- C. 气虚证
- D. 戴阳证
- E. 失血证

方正医学网答案：D

21. 女，30 岁。呕吐，腹胀 5 天。神志不清，胡言乱语 1 天，

平素体健。查体：T36.5℃，P90 次/分，R18 次/分，

BP120/80mmHg，巩膜明显黄染，心肺未见明显异常。腹软，无压痛，肝浊音界缩小。实验室检查：血 ALT520U/L，Tbil215 μmol/L，Dbil138 μmol/L。典型的肝脏病理改变主要的是

- A. 汇管区纤维化
- B. 多个小叶或大块肝细胞坏死
- C. 淤血性改变
- D. 汇管区中性粒细胞浸润
- E. 肝细胞脂肪变性

方正医学网答案：B

22. 女，22 岁。受凉后出现寒战、发热、咳嗽，咳少许黏痰 3 天，自服“感冒药”后热退。查体：T39.5℃，急性病容，右肺呼吸音减弱，语音震颤增强，血 WBC $13.4 \times 10^9/L$ ，N0.87。胸部 X 线片显示右下肺大片状模糊阴影。该患者抗感染治疗不宜首选的是

- A. 青霉素
- B. 左氧氟沙星
- C. 阿莫西林

D. 头孢曲松

E. 阿米卡星

方正医学网答案：E

23. 女，45 岁。因心慌气短，头晕就诊，心电图示阵发性室上性心动过速，曾试图用压迫颈动脉窦等方法无效。应首选的药物治疗是

- A. 奎尼丁
- B. 普萘洛尔
- C. 新斯的明
- D. 维拉帕米
- E. 普罗帕酮

方正医学网答案：D

24. 肺源性心脏病患者，长期出现低 O₂血症和 CO₂潴留，这时刺激呼吸的主要因素是

- A. 动脉血中 PO₂的降低
- B. 动脉血中 PCO₂的升高
- C. 动脉血中 H⁺升高
- D. 动脉血中 HCO₃⁻的降低
- E. 动脉血中 HCO₃⁻的增高

方正医学网答案：A

25. 以 mRNA 为模板合成蛋白质

时的起始密码子是

- A. UGA
- B. UAA
- C. AUG
- D. UAG
- E. AGU

方正医学网答案：C

26. 男，58 岁。胃部不适伴反酸

20 年，近 1 周来腹胀、恶心、呕吐，吐出大量宿食，每天 1~2 次。查体：呼吸浅，17 次/min，血压正常。上腹部可见胃型，轻压痛。测血 $K^+3.0\text{mmol/L}$ ， $Na^+130\text{mmol/L}$ ， $Cl^-90\text{mmol/L}$ ， $CO_2CP45\text{mmol/L}$ 。该患者的酸碱平衡失调的类型是

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒
- E. 代谢性碱中毒

方正医学网答案：E

27. 患者，男性，车祸伤及头部，伤后出现左侧鼻唇沟变浅，鼻出血，左耳听力下降，左外耳

道流出淡血性液体。诊断首先考虑

- A. 颅前窝骨折
- B. 颅中窝骨折
- C. 颅后窝骨折
- D. 左颞骨骨折
- E. 脑震荡

方正医学网答案：B

28. 男、49 岁，车祸后神志不清，3 小时，查体昏迷，右侧瞳孔直径 5mm，对光反射消失，左侧瞳孔直径 3mm，对光反射迟钝，左侧 Babinski 征 (+)，头颅 CT，右侧颞骨板下新月形，高密度影，同侧脑室受压，中线结构向左侧移位 1cm，急救时首先采取措施是

- A. 快速静脉滴注 20%甘露醇 250ml
- B. 地塞米松 10mg 快速静脉注射
- C. 尽快行去骨瓣减压术
- D. 气管切开保持呼吸道畅通
- E. 快速同侧脑室穿刺脑脊液引流术

方正医学网答案：A

29. 60 岁妇女，因枕部疼痛就诊，X 线显示第四脑室有压迫现象。某日突然患者出现意识丧失，呼吸停止。应首先考虑的情况是

- A. 右脑颞叶钩回疝
- B. 左侧颞叶钩回疝
- C. 大脑镰下疝
- D. 小脑扁桃体疝
- E. 小脑幕切迹疝

方正医学网答案：D

30. 男，71 岁。进行性右手震颤、动作缓慢 3 年，翻身困难 1 年。查体：面具脸，右手静止性震颤，四肢肌张力增高，行走缓慢。有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是

- A. 安坦
- B. 复方左旋多巴
- C. 丙炔苯丙胺(司来吉兰)
- D. 金刚烷胺
- E. 溴隐亭

方正医学网答案：B

31. 男，36 岁。3 年内抽搐发作

20 余次发作表现为无诱因的口角和右上肢抽搐，意识尚清，但不能对答，约 5~10s 后意识丧失伴全身抽搐。持续 30s 后，逐渐停止。事后不能回忆发作过程。发作间期的神经系统检查和常规脑电图检查未见异常。针对该患者的治疗首选药物是

- A. 氯硝西泮
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥
- D. 乙琥胺
- E. 卡马西平

方正医学网答案：E

32. 男，45 岁。双上睑下垂伴四肢无力 1 年晨轻暮重。治疗过程中出现呼吸困难、多汗流涎、瞳孔缩小，最可能的原因是

- A. 5-HT 系统亢进
- B. 肾上腺素能系统亢进
- C. 胆碱能系统抑制
- D. 肾上腺素能系统抑制
- E. 胆碱能系统亢进

方正医学网答案：E

33. 医生问患者为什么住院了，

患者答道：“我有 2 个孩子，红桃代表我的心，你放开手，是计算机病毒，保养自己....”，这属于什么症状

- A. 思维奔逸
- B. 病理性赘述
- C. 刻板言语
- D. 持续言语
- E. 思维破裂

方正医学网答案：E

34. 男，18 岁。近一年来对家人亲友变得冷淡，不去上学，不洗澡，不主动更换衣服，对自己有关的各种事情表现的无动于衷。最可能的诊断是精神分裂症

- A. 偏执型
- B. 单纯型
- C. 紧张型
- D. 青春型
- E. 混合型

方正医学网答案：B

35. 患者，女，16 岁。3 个月前和同学吵架后，觉得同学在背后议论她、骂她，觉得有人跟

踪自己，想要自杀。查体：躯体及神经系统无阳性体征。临床诊断为精神分裂症。改善患者目前情况较合理的第二代抗精神病药物是

- A. 丙咪嗪
- B. 氯硝西泮
- C. 碳酸锂
- D. 利培酮
- E. 氯丙咪嗪

方正医学网答案：D

36. 女，25 岁，2 年来常在遇到不高兴的事情时，生气哭闹，出现四肢强直和抽搐样表现，发作时能听清楚家人的呼唤，不语，流眼泪，无唇舌咬伤和大小便失禁，本次因再次出现类似发作就诊，入院查体，呼之不应，不时四肢抽搐样发作，瞳孔无散大，对光反射存在，可能诊断

- A. 分离(转换)障碍
- B. 恐惧性焦虑障碍
- C. 原发性癫痫
- D. 抑郁障碍
- E. 创伤后应激障碍

方正医学网答案：A

37. 在实施三级预防时，重点在第一级预防，同时兼顾二、三级预防的疾病是

- A. 急性阑尾炎
- B. 流行腮腺炎
- C. 糖尿病
- D. 食物中毒
- E. 肺炎

方正医学网答案：C

38. 某市随机抽取 206 名成年男性和 201 名成年女性，了解其 HBsAg 携带情况，其中男性阳性人数为 33 人，阳性率为 16.02%，

女性阳性人数 22 人，阳性率 10.94%，已知全省男性 HBsAg 阳性携带率为 17.3%，用 Z 检验比较两率，下列说法正确的是

- A. P 越大，越有理由说明两个总体率不同
- B. P 越小，越说明两样本率差别越小
- C. P 越小，越有理由说明两个样本率不同
- D. P 越大，越有理由说明两个样

本率不同

E. P 越小，越有理由说明两总体率不相同

方正医学网答案：E

39. 欲用统计图比较 1994-2003 年城市和农村 3 岁以下儿童贫血患病率的变化趋势，选用何种统计图为合适

- A. 条图
- B. 线图
- C. 圆图
- D. 直方图
- E. 散点图

方正医学网答案：B

40. 某乡有 4 万人，约 1 万户。欲抽样调查 4000 人，按该乡家庭人口登记名册，以户为单位，随机抽取第 1 户，随后每间隔 10 户再抽取 1 户，对被抽到的家庭进行调查。这种抽样方法称为

- A. 单纯随机抽样
- B. 系统抽样
- C. 整群抽样
- D. 多级抽样

E. 分层抽样

方正医学网答案：B

41. 在 1000 名病例与 1000 名对照的病例对照研究中。有 500 名病例和 200 名对照有暴露史，OR 值应为

- A. 1.4
- B. 2.3
- C. 4.2
- D. 无法计算
- E. 4

方正医学网答案：E

42. 男, 45 岁。因反复咳嗽一个月到社区卫生服务中心就诊。医生与其交谈得知该患者已经吸烟 20 多年。年前曾经尝试戒烟一个月并得到家人的支持和鼓励。家人对其的戒烟督促属于影响行为的

- A. 倾向因素
- B. 促成因素
- C. 强化因素
- D. 内在因素
- E. 诱导因素

方正医学网答案：C

43. 某聚会后有用餐者先后因腹痛、腹泻就诊。大部分患者出现上腹和脐周阵发性绞痛，继而腹泻，5~10 次/天，粪便呈洗肉水样。调查发现聚餐的主要食物为海鲜(鱼虾)类食品。引起该食物中毒的病原菌最有可能是

- A. 葡萄球菌
- B. 副溶血性弧菌
- C. 沙门菌
- D. 肉毒梭菌
- E. 李斯特菌

方正医学网答案：B

44. 患者，女，18 岁。对雷雨天气感到恐惧每逢雷雨则逃至楼下角落藏匿。她认为雷电交加、暴雨倾盆最为恐惧；大雨次之；阴天最轻。医师在教会她放松技术后，让她先想象阴天，当无紧张时再升级想象下雨，如有紧张感，则要她重复放松，直至想象通过全部恐怖。然后进行实景暴露，消除对雷雨的回避行为。这种治疗方法是

- A. 系统脱敏疗法
- B. 冲击疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 生物反馈疗法
- E. 松弛疗法

方正医学网答案：A

45. 患者，男，70 岁。被诊断为抑郁障碍，某天得知其一位老朋友是心理治疗师，心想熟人好办事，遂向其求助，但遭到了拒绝。该心理治疗师拒绝提供服务所依据的心理治疗原则是

- A. 回避原则
- B. 中立原则
- C. 真诚原则
- D. 耐心原则
- E. 保密原则

方正医学网答案：A

46. 患者女，糖尿病史 10 余年，下肢溃烂入院治疗，医生诊断建议截肢，患者表现神情淡漠，不配合治疗，该患者属于

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为异常

- C. 角色行为缺如
- D. 角色行为强化
- E. 角色行为减退

方正医学网答案：B

47. 患者有损害，不属于推定医疗机构有过错的情形是

- A. 隐匿有关病历资料的
- B. 伪造、篡改或销毁病历资料
- C. 拒绝提供有关病历资料的
- D. 医疗事故造成患者死亡的
- E. 违反有关诊疗规范规定的

方正医学网答案：D

48. 某公司生产一批中药饮片，说明书功效与省级标准不符合，该药属于

- A. 超说明书用药
- B. 假药
- C. 劣药
- D. 新药
- E. 合格药

方正医学网答案：B

49. 具有麻醉药品处方资格的执业医师违反规定开具麻醉药品造成严重后果的，卫生行政

部门依法对其作出的处理是

- A. 暂停执业半年
- B. 吊销执业证书
- C. 取消麻醉药品处方资格
- D. 警告
- E. 罚款

方正医学网答案：B

50.《医疗机构从业人员行为规范》提出的医疗机构从业人员执业的价值目标是

- A. 为人民健康服务
- B. 发扬人道主义精神
- C. 树立大医精诚理念
- D. 以患者为中心
- E. 救死扶伤、防病治病

方正医学网答案：A

51. 一高中女生 18 岁，因乳房刺痛来医院就诊，诊室内除了一个女医生外还有一个男医学生，女医生未开口问诊，在让男医学生回避后才开始对患者问诊和查体。女医生在诊疗过程中体现了

- A. 体贴关心，充分尊重
- B. 过程耐心

C. 认真仔细

D. 全面系统

E. 态度热情

方正医学网答案：A

52. 医学道德评价的首要标准是：是否有利于

- A. 患者疾病的缓解和康复
- B. 医疗机构的发展
- C. 人类生存和环境保护及改善
- D. 医学科学发展和社会进步
- E. 医务人员社会地位的提升

方正医学网答案：A

53. 男性，29 岁，大量饮酒后呕吐鲜血一小时，量约 800ml，查体 P110 次/分，血压 92/65mmHg，神志清楚，未见肝掌，蜘蛛痣，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音 12 次/分，为明确诊断最有意义的检查

- A. 腹部 CT
- B. 上消化道 X 线钡餐造影
- C. 腹部 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 胃镜

方正医学网答案：E

54. 女，45 岁。1 年来久站或长时间行走时觉左下腹部胀痛不适。查体：T 36.5℃，P 80 次/分，R 18 次/分，BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛，立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物，平卧时可缩小，咳嗽时无明显冲击感，压迫内环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是

- A. Shouldice 法疝修补术
- B. McVay 法疝修补术
- C. Bassini 法疝修补术
- D. Halsted 法疝修补术
- E. Ferguson 法疝修补术

方正医学网答案：B

55. 男，28 岁，中上腹反复疼痛 3 年，突发刀割样剧痛 2 小时，平素腹痛于饥饿时明显，进食后稍缓解，未规律治疗，手术中探查发现十二指肠球部后壁穿孔，直径约 5mm，最佳的手术方式是

- A. 胃大部切除胃空肠

roux-en-y 吻合

- B. 毕 II 式胃大部切除术
- C. 毕 I 式胃大部切除术
- D. 穿孔修补术
- E. 胃全切除术

方正医学网答案：D

56. 患者，男性，56 岁。阵发性腹痛 6 天，伴恶心、腹胀 2 天入院，无发热。体格检查：腹膨隆，见肠型，肠鸣音亢进，有气过水声。腹部平片见腹中部扩张小肠呈“阶梯状”液平，结肠内少量积气。可能的诊断

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 低位小肠梗阻
- C. 高位小肠梗阻
- D. 绞窄性小肠梗阻
- E. 坏死性小肠梗阻

方正医学网答案：B

57. 女，50 岁。间歇性右上腹痛伴皮肤巩膜黄染半年，再次发作 2 天。查体：T36.5℃，P80 次/分，R18 次/分，BP120/80 mmHg。皮肤巩膜明显黄染，未见肝掌，蜘蛛痣。右上腹压痛，

无明显肌紧张和反跳痛。B 超检查示胆囊内多发泥沙样结石，胆总管略扩张。最恰当的手术方式是

- A. 胆肠吻合术
- B. 胆囊切除、胆总管探查术
- C. 胆囊造口、胆总管探查术
- D. 胆囊造瘘术
- E. 腹腔镜胆囊切除术

方正医学网答案：B

58. 男性，39 岁，胃大部切除、毕 II 式吻合术后 20 天，进食后 30 分钟上腹突然胀痛，喷射性呕吐大量不含食物的胆汁，吐后腹痛消失，其可能的原因是

- A. 吻合口梗阻
- B. 输出袢梗阻
- C. 慢性不完全性输入袢梗阻
- D. 急性完全性输入袢梗阻
- E. 倾倒综合征

方正医学网答案：C

59. 男性，大便时发现肛门有脱出物，大便后自行回纳，该病例分度属于几度

- A. I 度

B. II 度

C. III 度

D. IV 度

E. V 度

方正医学网答案：B

60. 男，50 岁，呕血、黑便 1 周，既往冠心病病史，规律服用药物治疗。查体：T 37℃，P 102 次/分，BP 125/85mmHg。精神差，巩膜不黄。上腹部轻压痛，反跳痛（-）。肝脾肋下未触及，移动性浊音（-）。导致其消化道出血最可能的原因是

- A. 口服非甾体类抗炎药
- B. 食管胃底静脉曲张
- C. 粗纤维食物摄入不足
- D. 大量放射性物质
- E. 长期吸烟

方正医学网答案：A

61. 男，48 岁，一小时前被机动车撞伤腹部，诉腹痛，程度逐渐加重。查体：T 38.5℃，P 90 次/分，R 20 次/分，BP 100/74 mmHg。痛苦貌，腹壁完整，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，以

脐周为著。腹部 B 超：肠间少量积液，肝周、膈下未见明显异常。导尿时导出黄色尿液 300ml。患者最有可能发生了

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 小肠破裂
- D. 肾破裂
- E. 胰腺破裂

方正医学网答案：C

62. 患者，男性，32 岁，反复间断性腹痛、腹泻 10 年，大便 3~4 次/日，多为不成形黄色便，不含黏液及脓血，排便后腹痛可缓解，查体：T 36.8℃，体形消瘦，腹部平软，无压痛反跳痛。结肠镜检查未见明显异常。考虑治疗的药物首选

- A. 匹维溴铵
- B. 异烟肼
- C. 泼尼松龙
- D. 喹诺酮
- E. 柳氮磺胺吡啶

方正医学网答案：A

63. 患者，女性，55 岁。上腹部

绞痛伴高热 1 天，皮肤黄染 2 小时，腹痛位于右上腹，呈阵发性、进行性加剧，向右肩放射，伴呕吐。查体：神志模糊，高热、脉率加快、呼吸加快、血压低，皮肤巩膜黄染，上腹肌紧张，压痛，反跳痛阳性，尿色深黄。该患者最可能的诊断是

- A. 胆囊结石
- B. 急性胆囊炎
- C. 肝外胆管结石
- D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- E. 胰头癌

方正医学网答案：D

64. 男，5 岁，体重 16kg，双臀，双下肢开水烫伤。查体：双臀，双下肢（包括双足）皮肤出现水疱，创面红润湿润，明显疼痛。第一天 24h 补液量为

- A. 晶体液 600ml，胶体液 600ml，生理需要量 1300ml
- B. 晶体液 800ml，胶体液 400ml，生理需要量 1300ml
- C. 晶体液 800ml，胶体液 400ml，生理需要量 1100ml

D. 晶体液 800ml, 胶体液 400ml,
生理需要量 1000ml

E. 晶体液 600ml, 胶体液 600ml,
生理需要量 2000ml

方正医学网答案: A

65. 女, 40 岁, 月经正常。右乳腺癌根治术后, 病理报告为: 右乳腺浸润管癌, 右腋窝淋巴结 (4/20) 转移, 雌激素受体和孕激素受体检测均为阴性。治疗是

A. 应用芳香化酶抑制剂

B. 卵巢放疗

C. 化疗

D. 应用雌激素受体抑制剂

E. 卵巢切除

方正医学网答案: C

66. 以下不是有机磷农药中毒的毒蕈碱样作用的是

A. 肌肉强直性痉挛

B. 心血管活动受抑制

C. 瞳孔括约肌、睫状肌兴奋

D. 消化道、呼吸道腺体兴奋

E. 支气管、胃肠道平滑肌兴奋

方正医学网答案: A

67. 男, 32 岁。炸石作业时不慎炸伤右大腿 5 小时。伤后出血约 400ml。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP

110/80mmHg, 神志清楚, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。右大腿可见一长约 10cm 不规则皮肤伤口, 肌肉部分破损。对该患者处理错误的是

A. 清创后一期缝合伤口

B. 扩创、引流后延期缝合

C. 同时应用抗生素和 TAT

D. 清创时探查深部损伤情况

E. 伤口近心端扎止血带, 送医院

方正医学网答案: A

68. 女, 40 岁, 右乳腺癌 2.3cm × 4.5cm × 4.2cm, 局部侵犯胸壁, 不可推动, 右侧腋窝扪及 5 枚质硬淋巴结, 互相粘连融合, 未发现远处转移, 该患者临床分期是

A. T₁N₂M₀

B. T₂N₂M₀

C. $T_3N_2M_0$ D. $T_4N_1M_0$ E. $T_4N_2M_0$

方正医学网答案：E

69. 男，36 岁，因血尿 2 天入院，查体见血压升高至 140/90 mmHg，镜下满视野红细胞，尿蛋白（++），为明确诊断，该患者需完善的检查是

A. 血常规

B. 尿相差显微镜检查

C. 清洁中段尿细菌培养

D. 尿沉渣实验

E. APTT、PT 等凝血功能检查

方正医学网答案：B

70. 女，45 岁，反复尿频、尿急、尿痛 5 年，夜尿增加半年。尿常规：比重 1.010，RBC2~3/HP，WBC 10~15/HP，蛋白（+），清洁中段尿培养：大肠埃希菌 $>10^5$ /ml。其最可能诊断为

A. 尿道炎

B. 肾结石

C. 急性膀胱炎

D. 慢性肾盂肾炎

E. 肾周围炎

方正医学网答案：D

71. 女性，62 岁，左腰痛伴发热 5 天，最高体温 39.2℃，抗生素治疗体温无明显下降，左肾区叩击痛，心率 102 次/分，血压 110/75mmHg。血常规：白细胞 $15.3 \times 10^9/L$ ，NO.85，尿沉渣：白细胞满视野，RBC3~5/HP。泌尿 CT 平扫：左肾扩张积水，左输尿管上段 1.2cm 结石，下一步治疗措施是

A. 体外冲击波碎石

B. 输尿管镜取石

C. 尿道逆行置管术

D. 膀胱输尿管镜取石

E. 经皮肾镜取石

方正医学网答案：C

72. 10 岁男孩。右侧阴囊肿大 2 年。晨起变小，活动后增大。查体：右侧阴囊肿大，可触及囊性感，挤压时缩小，缩小后睾丸可触及正常大小。透光试验阳性。最可能的诊断是

A. 腹股沟斜疝

B. 辜丸鞘膜积液

C. 精索鞘膜积液

D. 交通性鞘膜积液

E. 精索静脉曲张

方正医学网答案：D

73. 男孩，14 岁，不慎摔倒，左手掌撑地，当即出现左腕部疼痛、肿胀，左手活动受限。伤后自觉左手拇指、食指无法主动屈曲，不能完成“对掌”动作，左手掌桡侧 3 指半皮肤感觉麻木。患者可能损伤的神经是

A. 正中神经（腕部以下）

B. 正中神经（肘部）

C. 尺神经（腕部）

D. 正中神经合并桡神经损伤

E. 尺神经（肘部）

方正医学网答案：A

74. 女，42 岁。腰腿痛 2 个月。查体：下腰椎旁压痛，左下肢直腿抬高试验阳性（ 50° ），加强试验阳性，外踝及足背外侧皮肤感觉减弱，踝反射消失，考虑为腰椎间盘突出症，最可

能累及的神经根是

A. L_4

B. L_5

C. S_1

D. L_1

E. L_2

方正医学网答案：C

75. 女，78 岁。跌倒右髋受伤 2 小时，局部疼痛，活动受限，患肢缩短，轴向叩击痛（+），X 线片显示右股骨颈基底部骨皮质连续性中断，断段嵌插，Pauwells 角 25° ，一般状态差，既往高血压，肺心病，糖尿病病史 30 余年，心功能 IV 级，最佳治疗方案是

A. 闭合复位内固定

B. 切开复位内固定

C. 下肢中立位皮牵引 6~8 周

D. 转子间截骨矫正力线

E. 人工关节置换术

方正医学网答案：C

76. 男，24 岁。颜面部水肿、肉眼血尿伴咳嗽、痰中带血 1 周，少尿 3 天。BP 160/100mmHg，

尿蛋白(++)，RBC 20~30/HP，血 Cr 420 $\mu\text{mol/L}$ ，血清抗肾小球基底膜抗体阳性。B 超示双肾增大。目前最关键的治疗是

- A. 血液透析
- B. 泼尼松
- C. 血浆置换
- D. 丙种球蛋白
- E. 泼尼松联合环磷酰胺

方正医学网答案：C

77. 女，66 岁。2 小时前跌倒时手掌着地受伤。查体：右腕明显肿胀，压痛(+)，侧面观呈“银叉样”畸形。最可能的诊断是

- A. Galeazzi 骨折
- B. Colles 骨折
- C. Chance 骨折
- D. Monteggia 骨折
- E. Smith 骨折

方正医学网答案：B

78. 女，65 岁。右膝关节内侧严重疼痛，下蹲和下楼困难，步行距离 500 米。查体：右膝关节明显内翻畸形，屈伸受限，

关节活动度 (ROM)：100° ~ 200°。负重位双膝关节 X 线片显示右膝内侧间隙明显狭窄，关节周边骨质增生，膝关节软骨磨损，关节面硬化，髌骨上下极骨赘形成。最合适的治疗方案是

- A. 人工膝关节置换术
- B. 关节镜清理术
- C. 关节腔药物注射
- D. 关节融合术
- E. 口服非甾体抗炎药

方正医学网答案：A

79. 男，55 岁，右侧颈肩部疼痛伴麻木，右上肢放射痛，右上肢肌力下降，查体：颈椎棘突间压痛，Spurling 试验

(+), Eaton 试验(+), Hoffmann 征(-)，可能的诊断是

- A. 交感神经根型颈椎病
- B. 脊髓型颈椎病
- C. 神经根型颈椎病
- D. 椎动脉型颈椎病
- E. 复合型颈椎病

方正医学网答案：C

80. 女，25 岁，B 超提示：早孕 46 天，下列不可能发生的是

- A. 宫颈阴道部充血呈紫蓝色
- B. 宫颈阴道内膜充血呈紫蓝色
- C. 子宫略增大呈球形
- D. 耻骨联合上可触及子宫
- E. 宫颈与宫体似不相连

方正医学网答案：D

81. 患者，女，29 岁，孕 36 周。产前检查见胎背位于母体腹部左侧，胎心位于左上腹，宫底可触及浮球感。诊断胎方位是

- A. LOA
- B. LOT
- C. RSA
- D. LSA
- E. LOP

方正医学网答案：D

82. 新生儿出生后 1 分钟，全身皮肤苍白，呼吸浅慢，心率 99 次/min，规律，四肢稍屈，吸痰时无反应。该患儿 Apgar 评分为

- A. 1 分
- B. 2 分

C. 3 分

D. 4 分

E. 5 分

方正医学网答案：C

83. 女，25 岁，停经 60 天。下腹痛伴阴道流血 5 小时，相当于月经量。3 周前尿 HCG(+)，1 周前超声提示宫内活胎 9 周。

妇科检查：阴道内见大量出血，宫颈口见组织物及活动性出血，子宫如妊娠 6 周，无压痛，双附件无异常。以下止血最有效的是

- A. 应用止血药物
- B. 立即刮宫术
- C. 口服前列腺类药物
- D. 阴道内填塞纱布
- E. 静脉滴注缩宫素

方正医学网答案：B

84. 女，31 岁，G₁P₀，妊娠 41 周，阴道流液 3 小时，色清亮，无腹痛。平素月经规律，妊娠期经过顺利。1 天前，超声羊水指数 6.5cm。产科检查，骨盆测量正常，LOA，胎心 140 次/分，

NST 有反应型。目前恰当的处理是

- A. 立即行剖宫产术
- B. 静滴缩宫素以加强宫缩
- C. 继续观察产程进展
- D. 行人工破膜以加速产程
- E. 予静注哌替啶以缓解产妇紧张情绪

方正医学网答案：C

85. 初产妇，32 岁，身高 160cm，胎儿估重 3500g，妊娠 38⁺周，自然临产 20 小时，现宫缩间隔 1~2 分钟，持续 40~60s，患者烦躁，疼痛，腹部可见病理性缩复环（一环形凹陷），子宫下段压痛，胎心监测反复早期减速，宫口近开全，S=+2，最可能的诊断是

- A. 子宫破裂
- B. 羊水栓塞
- C. 胎膜早破
- D. 胎盘早剥
- E. 先兆子宫破裂（治疗：剖宫产）

方正医学网答案：E

86. 女，32 岁，阴道分泌物增多 1 月。查体：阴道内稀薄白带。阴道 pH 值为 5，阴道分泌物线索细胞阳性，患者首选的治疗药物是

- A. 链霉素
- B. 甲硝唑
- C. 红霉素
- D. 氧氟沙星
- E. 青霉素

方正医学网答案：B

87. 女，34 岁，妊娠 23 周，腹痛两周，加重伴发热一天无阴道流血，既往子宫肌瘤病史 3 年。查体：未触及宫缩，B 超示子宫前壁一个 8cm 实性凸起，最可能诊断是

- A. 子宫肌瘤合并感染
- B. 子宫肌瘤合并肉瘤样变
- C. 子宫肌瘤合并玻璃样变
- D. 子宫肌瘤合并红色样变
- E. 子宫肌瘤合并囊性变

方正医学网答案：D

88. 女性，35 岁，G₁P₀，妊娠 38 周，胎心 140 次/分，胎位 LOA，

坐骨棘间径 9cm, 坐骨结节间径 8cm, 出口后矢状径 6cm, S-1。

目前恰当的处理是

- A. 行人工破膜
- B. 静滴缩宫素加强宫缩
- C. 继续观察产程进展
- D. 行剖宫产术
- E. 产钳助产

方正医学网答案: D

89. 女, 30 岁。阴道不规则流血 20 天, 咳嗽 5 天。半年前曾行人工流产手术, 术中刮出绒毛组织。妇科检查: 子宫如 40 天妊娠大小, 质软, 双侧附件区均可触及大小约 5cm 的囊性包块。胸部 X 线片示双侧肺中下野多发棉球状阴影。首先考虑的诊断是

- A. 绒毛癌
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 葡萄胎
- D. 先兆流产
- E. 稽留流产

方正医学网答案: A

90. 女, 26 岁。人工流产后闭

经 6 个月, 无腹痛。既往月经规律, 尿妊娠试验阴性, 基础体温双相型。最可能的诊断是

- A. Asherman 综合征
- B. Sheehan 综合征
- C. 闭经-溢乳综合征
- D. 空蝶鞍综合征
- E. 多囊卵巢综合征

方正医学网答案: A

91. 女性, 75 岁, G_3P_2 , 发现阴道脱出物一个月。查体: 宫体未脱出, 部分宫颈脱出阴道外。患者既往高血压 20 年, 一个月前出现心肌梗塞。目前患者最佳的治疗方案是

- A. 阴道封闭术
- B. 子宫托
- C. 子宫全切术
- D. 子宫韧带缩短术
- E. 药物治疗

方正医学网答案: B

92. 新生儿, 生后 14 天, 拒乳, 反应差 2 天, 黄疸 1 天, 颈部、前胸部可见多个脓疱, 脐部有分泌物, 前囟门平软, 皮肤中

度黄染，肝脏肋下 2cm，脾脏肋下 1.5cm，可诊断为

- A. 新生儿颅内出血
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿黄疸
- D. 感染性肺炎
- E. 新生儿化脓性脑膜炎

方正医学网答案：B

93. 5 岁男孩，高热 9 天，皮肤黏膜损害 3 天入院。查体：热病容，反应良好。结膜充血，口腔黏膜发红、干裂。右颈部淋巴结肿大，大小约 1cm×1cm。全身红色斑丘疹，手足微肿胀。心肺无异常，肝脾无肿大。末梢血 WBC $15 \times 10^9/L$ 。血细菌培养阴性。该患者的治疗首选

- A. 阿司匹林+丙种球蛋白
- B. 糖皮质激素
- C. 阿司匹林+糖皮质激素
- D. 糖皮质激素+丙种球蛋白
- E. 双嘧达莫+丙种球蛋白

方正医学网答案：A

94. 女孩，10 个月，发热，伴间断呕吐 10 天。体检：精神可，

较兴奋，方颅。脑脊液：外观毛玻璃样，白细胞 $30 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞 0.60，清蛋白 0.43g/L，氯化物 108mmol/L，糖 2.5mmol/L。可能的诊断是

- A. 急性细菌性脑膜炎（化脓性脑膜炎）
- B. 结核性脑膜炎
- C. 病毒性脑炎
- D. 流行性脑炎
- E. 感染中毒性脑病

方正医学网答案：B

95. 女婴，9 个月。腹泻 3 天，加重 2 天。黄绿色水样便每日 10 余次，量多、腥臭、伴高热、呕吐、少尿。查体：精神萎靡，前囟眼窝凹陷，皮肤弹性差，心音较低钝，腹胀，肝脾不大。实验室检查：粪镜检有大量脓细胞，血钠 135mmol/L，血钾 3.6mmol/L。患儿最可能诊断是

- A. 轮状病毒肠炎
- B. 大肠埃希菌肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌肠炎
- D. 柯萨奇病毒
- E. 真菌性肠炎

方正医学网答案：C

96. 女孩，1 岁。发热伴咳嗽 5 天，加重伴呼吸困难 1 天，曾予青霉素治疗 3 天，查体：T39℃，嗜睡，精神反应差，躯干可见散在红色斑丘疹，呼吸急促，双肺可闻及中小水泡音。血 WBC $22 \times 10^9/L$ 。N 0.90，L 0.10。胸部 X 线片示双肺斑片影、肺大疱。首先考虑的诊断是

- A. 腺病毒肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

方正医学网答案：B

97. 女，10 岁，幼儿时反复肺炎，上小学后才有所好转。查体：心前区隆起，胸骨左缘第 2 肋间闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，双手无异常，足部杵状趾。经皮血氧饱和度：右手 92%，左手 98%，左足 85%，右足 86%。该现象可能的原因是

- A. 房间隔缺损，右向左分流

- B. 动脉导管未闭，右向左分流
- C. 室间隔缺损，双向分流
- D. 法洛四联症，右向左分流
- E. 室间隔缺损，右向左分流

方正医学网答案：B

98. 男孩，3 岁。因颜面及四肢凹陷性水肿 1 周来诊。查体：BP 85/55mmHg，尿蛋白（+++），RBC 1~2/HP，血浆总蛋白 40g/L，白蛋白 24g/L，胆固醇 6.2mmol/L，尿素氮 5.5mmol/L，最可能的诊断是

- A. 单纯型肾病综合征
- B. 急进型肾小球肾炎
- C. IgA 肾病
- D. 肾炎型肾病综合征
- E. 急性肾小球肾炎

方正医学网答案：A

99. 女孩，9 岁，诊断为肾病综合征，使用足量泼尼松治疗 3 周，复查尿蛋白（++~+++），目前首选的治疗方法是

- A. 甲泼尼松/糖皮质激素冲击治疗
- B. 加用环孢素治疗

C. 继续足量泼尼松/糖皮质激素治疗

D. 增量泼尼松/糖皮质激素治疗

E. 减量泼尼松/糖皮质激素治疗

方正医学网答案：C

100. 女婴，10 个月，发热伴呕吐，腹泻 2 天，大便 10~15 次每天，呈蛋花汤状，呕吐频繁，尿量极少，查体：T38.3℃，精

神萎靡，皮肤弹性差，呈花纹状，前囟、眼窝可见明显凹陷，四肢厥冷，血钠 135mmol/L，粪镜检偶见白细胞。该患儿脱水程度是

A. 中度等渗性脱水

B. 中度低渗脱水

C. 重度高渗脱水

D. 重度等渗脱水

E. 重度低渗脱水

方正医学网答案：D