方正医考

临床执业（含助理）医师笔试

考前（临床）100题

多看一题　多考一分

主编　方正医考教研室

方正教育 FZ EDUCATION

扫码获取分校联系方式

关注“方正网校”获取更多资讯

全国加盟：胡老师 17837886667

临床执业（含助理）医师资格考试

考前 100 题

1.女，28 岁。足月临产，产科检查：胎头矢状缝在骨盆入口右斜径上，前囟在骨盆的右后方，其胎方位为

A.枕左横　　B.枕右前

C.枕左前　　D.枕左后

E.枕右后

方正医学网答案：C

2.新生儿出生后 1 分钟，全身皮肤苍白，呼吸浅慢，心率 100 次/min，规律，四肢稍屈，吸痰时无反应。该患儿 Apgar 评分为

A.1 分　　B.2 分

C.3 分　　D.4 分

E.5 分

方正医学网答案：D

3.24 岁初产妇，规律宫缩 10 小时，连续观察 3 小时，宫口由 6cm 开大至 7cm，S+1，胎心 140 次/分，本例恰当的处置是

A.给予缩宫素　B.剖腹产

C.产钳助产　　D.人工破膜

E.观察

方正医学网答案：A

4.初产妇，28 岁。妊娠 33 周，阴道少量流血及规律腹痛 2 小时。肛门检查：宫颈管进行性缩短。该患者最可能的诊断是

A.先兆临产　　B.胎盘早剥

C.前置胎盘　　D.先兆早产

E.早产临产

方正医学网答案：D

5.女，29 岁，妊娠 26 周，恶心乏力 1 周，伴上腹不适，皮肤明显黄染，查体：脉搏 85 次/分，血压 125/70mmHg，血清总胆红素 210μmol/L，尿胆红素（+），超声示肝脏缩小。最可能的诊断是

A.慢性乙型肝炎（重度）

B.妊娠期肝内胆汁淤积症

C.HELLP 综合症
D.妊娠合并乙型肝炎（重度）
E.妊娠期急性脂肪肝
方正医学网答案：D

6.女，26 岁，G_1P_0。患者于经期有性生活史，随后出现持续性下腹痛 7 天。查体：体温 38.8℃。妇科检查：阴道通畅，黏膜充血；宫颈充血红肿，可见大量脓性分泌物；宫颈举痛（+）；子宫大小如常，活动度差，压痛（+）；左侧附件区明显增厚，压痛（+），似可触及肿物。该患者最可能的诊断是
A.卵巢肿瘤蒂扭转
B.黄体破裂
C.盆腔炎症性疾病
D.盆腔结核
E.子宫内膜异位症
方正医学网答案：C

7.女，32 岁，妊娠 24 周，腹痛两周，加重伴发热一天无阴道流血，既往子宫肌瘤病史 2 年。查体：未触及宫缩，B 超示子宫前壁一个 6cm 实性凸起，最可能诊断是
A.子宫肌瘤合并感染
B.子宫肌瘤合并肉瘤样变
C.子宫肌瘤合并玻璃样变
D.子宫肌瘤合并红色样变
E.子宫肌瘤合并囊性变
方正医学网答案：D

8.女，29 岁，停经 62 天，阴道持续少量流血 10 天，子宫如孕 3 月大小，血 hCG 200000 IU/L，盆腔超声提示：宫内充满不均质密集状回声，呈落雪样改变，双侧卵巢囊肿，直径均约 5cm，胸部 CT 未见异常。无阴道流血，无咳嗽咳痰，超声见宫腔少量积液。考虑诊断是
A.葡萄胎
B.侵蚀性葡萄胎
C.绒毛膜癌
D.胎盘原位滋养细胞瘤
E.胎盘残留
方正医学网答案：A

9.患者，女性，35 岁，月经稀发，周期规律 25～60 天/次，此次停经两月，口服黄体酮 10

天，停药后阴道流血，患者身高 156cm，体重 75kg，面部痤疮，该疾病的特征是 LH/FSH＞2。则最可能的诊断是
A. Turner 综合症
B. 卵巢早衰
C. 多囊卵巢综合征
D. 子宫性闭经
E. 卵巢性闭经
方正医学网答案：C

10. 女性，28 岁，结婚 3 年未避孕未孕，月经周期正常，基础体温双相型，输卵管造影提示双侧输卵管积水。该患者需要何种治疗方式
A. 腹腔镜手术
B. 中医治疗
C. 抗生素治疗
D. IVF-ET
E. 宫腔镜手术
方正医学网答案：A

11. 一健康女婴，体重 8kg，身长 69cm，已能抓物，换手、独坐久，能发复音。其符合的最早月龄是
A. 13～15 个月
B. 11～12 个月
C. 9～10 个月
D. 4～6 个月
E. 7～8 个月
方正医学网答案：E

12. 患儿，男，10 个月。因未及时添加辅食，近期出现多汗、烦躁不安、夜惊等症状。查体可见方颅、肋骨串珠。X 线长骨检查示：骨骺软骨明显增宽，干骺端临时钙化带消失，呈毛刷状及杯口样改变。该患儿目前处于疾病的哪个时期
A. 佝偻病初期
B. 佝偻病激期/活动期
C. 佝偻病恢复期
D. 佝偻病后遗症期
E. 先天性佝偻病
方正医学网答案：B

13. 新生儿，生后 14 天，拒乳，反应差 2 天，黄疸 1 天，颈部、前胸部可见多个脓疱，脐部有分泌物，前囟门平软，皮肤中度黄染，肝脏肋下 2cm，脾脏肋

下 1.5cm，可诊断为
A.新生儿颅内出血
B.新生儿败血症
C.新生儿黄疸
D.感染性肺炎
E.新生儿化脓性脑膜炎
方正医学网答案：B

14.女孩，2 岁，因发育迟缓就诊，查体：发色浅，皮肤白，心肺未见异常，双下肢肌张力稍高，腱反射亢进，鼠尿臭体味，最佳处理措施为
A.低酮饮食
B.低苯丙氨酸饮食
C.肌内注射维生素 B_{12}
D.口服青霉胺
E.服用甲状腺制剂
方正医学网答案：B

15.5 岁男孩，高热 9 天，皮肤黏膜损害 3 天入院。查体：热病容，反应良好。结膜充血，口腔黏膜发红、干裂。右颈部淋巴结肿大，大小约 1cm×1cm。全身红色斑丘疹，手足微肿胀。心肺无异常，肝脾无肿大。末梢血 WBC 15×10^9/L。血细菌培养阴性。该患者的治疗首选
A.阿司匹林+丙种球蛋白
B.糖皮质激素
C.阿司匹林+糖皮质激素
D.糖皮质激素+丙种球蛋白
E.双嘧达莫+丙种球蛋白
方正医学网答案：A

16.女孩，6 岁，发热 1 天，皮疹半天。查体显示：体温 38℃，颜面部、躯干部出现红色斑丘疹，部分为薄壁水疱，四肢未见皮疹，心肺腹部检查未见异常。根据这些症状，最有可能的诊断是
A.麻疹　　B.水痘
C.猩红热　　D.风疹
E.幼儿急疹
方正医学网答案：B

17.女孩，10 个月，发热，伴间断呕吐 10 天。体检：精神可，较兴奋，方颅。脑脊液：外观毛玻璃样，白细胞 30×10^6/L，中性粒细胞 0.40，清蛋白 0.43g/L，氯化物 108mmol/L，

糖 2.5mmol/L。可能的诊断是
A.急性细菌性脑膜炎（化脓性脑膜炎）
B.结核性脑膜炎
C.病毒性脑炎
D.流行性脑炎
E.感染中毒性脑病
方正医学网答案：B

18.女孩，2 岁，哭闹、腹痛 15 天，果酱样大便 2 次，查体：右上腹触及“腊肠样”包块，轻微压痛，右下腹空虚，肠鸣音亢进。腹部 B 超：右上腹包块为“同心圆”、“靶环征”。最可能的诊断是
A.急性阑尾炎
B.肠系膜淋巴结炎
C.小肠扭转
D.肠套叠
E.肠蛔虫
方正医学网答案：D

19.女婴，9 个月。腹泻 3 天，加重 2 天。黄绿色水样便每日 10 余次，量多、腥臭、伴高热、呕吐、少尿。查体：精神萎靡，前囟眼窝凹陷，皮肤弹性差，心音较低钝，腹胀，肝脾不大。实验室检查：粪镜检有大量脓细胞，血钠 135mmol/L，血钾 3.6mmol/L。患儿最可能诊断是
A.轮状病毒肠炎
B.大肠埃希菌肠炎
C.金黄色葡萄球菌肠炎
D.柯萨奇病毒
E.真菌性肠炎
方正医学网答案：C

20.患儿女，10 个月。1 天前出现发热、T38.8℃，犬吠样咳嗽、声音嘶哑、烦躁不安、安静时有吸气性喉鸣，听诊双肺可闻及喉传导音或管状呼吸音，心率加快。此患儿被诊断为急性感染性喉炎（最常见的病原体是病毒），其喉梗阻程度为
A.Ⅰ度　　B.Ⅱ度
C.Ⅲ度　　D.Ⅳ度
E.Ⅴ度
方正医学网答案：B

21.男婴，5 个月，咳嗽 3 天，喘憋 1 天，查体：37.8℃，P 150

次/分，R66 次/分，精神可，鼻翼煽动，口唇轻度发绀，三凹征阳性，双肺呼吸相哮鸣音及少许湿啰音，实验室检查血 WBC4.0×10^9/L,N 0.35,L 0.65。最可能的诊断是

A.呼吸道合胞病毒性肺炎

B.金黄色葡萄球菌肺炎

C.肺炎链球菌肺炎

D.支原体肺炎

E.腺病毒肺炎

方正医学网答案：A

22.男性 8 岁，乏力，查体，皮肤黏膜无皮疹出血点，双肺呼吸音清，心前区无震颤，胸骨左缘 2～3 肋间闻及 3/6 级收缩期喷射性杂音，肺动脉听诊区第二心音加强，并有固定分裂，腹软，肝脾未触及，考虑诊断为

A.室间隔缺损

B.房间隔缺损

C.法洛四联症

D.肺动脉狭窄

E.动脉导管未闭

方正医学网答案：B

23.患儿，男，6 岁。颜面及四肢凹陷性水肿 1 周。查体：T 36.0℃，BP 92/58mmHg，肝脾肋下未触及，腹软，无压痛、反跳痛。血常规未见异常。尿蛋白（+++），RBC 1～2/HP，血浆总蛋白 40g/L，白蛋白 20g/L，胆固醇 6.4mmol/L，尿素氮 5.5mmol/L。最可能的诊断是

A.单纯型肾病综合征

B.急进型肾小球肾炎

C.IgA 肾病

D.肾炎型肾病综合征

E.急性肾小球肾炎

方正医学网答案： A

24.男婴，4 个月，32 周娩出，2700g，随访发现：面色苍白，心脏听诊正常。查体：血红蛋白 68g/L，三系计数正常，网织红细胞 0.005。红细胞大小不一，以小细胞为主，中央淡染区明显，其诊断是

A.缺铁性贫血

B.生理性贫血

C.单纯红细胞再障贫血
D.地中海贫血
E.巨幼细胞性贫血
方正医学网答案：A

25.以下哪种术式是在精索的前方将腹内斜肌下缘与联合腱缝至腹股沟韧带上，消灭腹内斜肌下缘和腹股沟韧带之间的间隙，适用于腹横筋膜无显著缺损、腹股沟管后壁尚健全的病例
A.Shouldice 法
B.Halsted 法
C.Ferguson 法
D.McVay 法
E.Bassini 法
方正医学网答案：C

26.慢性肝病患者，血氨升高导致肝性脑病的机制是
A.蛋白质代谢紊乱
B.乙酰胆碱产生过多
C.去甲肾上腺素作用减弱
D.氨基酸代谢失衡
E.干扰脑细胞能量代谢
方正医学网答案：E

27.男，31 岁。5 天前因十二指肠球部溃疡行毕Ⅱ式胃大部切除术，今晨突然右上腹部剧痛、腹胀、恶心，呕吐少量血性液体。查体：腹肌紧张，伴压痛、反跳痛，右侧显著。血常规：Hb120g/L， WBC11.2×10^9/L，NO.85，Plt 112×10^9/L，最可能的诊断是
A.应激性溃疡穿孔
B.胃肠吻合口瘘
C.急性胰腺炎
D.胆囊穿孔
E.十二指肠残端破裂
方正医学网答案：E

28.男，58 岁。3 年前曾行直肠癌根治术，近 3 个月右上腹及背部胀痛，无发热，大便正常。查体：锁骨上未触及肿大淋巴结，腹平软，未触及肿物，肝肋下未触及。实验室检查：血 WBC 10×10^9/L，AFP 无升高。腹部 B 超示：肝右叶多个实性占位，最大直径约 3cm。首先应考虑的诊断是

A.阿米巴肝脓肿
B.肝血管瘤
C.多发肝囊肿
D.原发性肝癌
E.肝转移癌
方正医学网答案：E

29.患者男性，56 岁。阵发性腹痛 6 天，伴恶心、腹胀 2 天入院，无发热。体格检查：腹膨隆，见肠型，肠鸣音亢进，有气过水声。腹部平片见腹中部扩张小肠呈“阶梯状”液平，结肠内少量积气。可能的诊断
A.麻痹性肠梗阻
B.低位小肠梗阻
C.高位小肠梗阻
D.绞窄性小肠梗阻
E.坏死性小肠梗阻
方正医学网答案：B

30.患者，女，45 岁，反复发作右上腹绞痛伴黄疸 3 年，MRCP 检查有胆结石，上段扩张，胆总管远端狭窄，最合适的手术方法
A.胆囊切除，胆总管空肠吻合术
B.腹腔镜胆囊切除术
C.Oddi 括约肌切开术+引流
D.胆总管切开取石术 T 管引流
E.开腹胆囊切除术
方正医学网答案：A

31.男，50 岁，近 2 个月来大便次数增多，有肛门坠胀感及里急后重，大便变细。常有黏液血便，经抗生素治疗症状可缓解，但不久又复发，且呈进行性加重。若经病理检查证实为直肠腺癌，肿瘤下缘距肛门约 12cm，肿块直径约 4cm。最佳手术方式是
A.Miles 手术
B.局部切除
C.Hartmann 手术
D.Dixon 手术
E.乙状结肠造口术
方正医学网答案：D

32.男，60 岁，腹泻、便秘交替，粪便带血 6 个月，体重减轻 5kg。查体：T 36.5℃，P 80 次/分，R 18 次/分，BP 120/80mmHg，

双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率 80 次/分，律齐，腹软，无压痛。血常规：Hb 120g/L，WBC 15.6×10^9/L，N 0.86。结肠镜检查于乙状结肠见溃疡性病灶，超声内镜提示病灶侵犯肠壁浆膜下层，肠系膜可扪及 4 个区域淋巴结肿大。PET 显示全身其他部位未见癌转移。该病人 TNM 分期考虑为

A. $T_3N_2M_0$　　B. $T_2N_3M_0$

C. $T_4N_3M_0$　　D. $T_3N_3M_0$

E. $T_2N_2M_0$

方正医学网答案：A

33.（助理不考）男，56 岁。皮肤黄染 1 个月，逐渐加深，伴皮肤瘙痒，大便灰白色，无发热。查体：T 36.8℃，P 85 次/分，R 18 次/分，BP 130/80 mmHg，巩膜、皮肤黄染，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率齐。腹软，肝肋下 4cm，未触及肿大胆囊，Murphy 征阴性。腹部 CT：肝总管上段 2cm×1.5cm 占位病变，最适宜的术式是

A. 肝门胆管、胆囊、部分肝外胆管及部分肝门区的肝组织切除

B. 全胰腺切除术

C. ERCP 取石术

D. 胰头十二指肠切除术

E. 左三叶肝切除

方正医学网答案：A

34. 女，65 岁。阵发性腹痛、腹胀、停止排气排便 2 天。既往有类似发作，程度较轻，未诊治。查体：P 100 次/分，BP110/70 mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率 100 次/分，心律齐，腹肌紧张，压痛明显，反跳痛阳性，移动性浊音阳性。最可能的诊断是

A. 不全性粘连性肠梗阻

B. 单纯性机械性肠梗阻

C. 绞窄性肠梗阻

D. 麻痹性肠梗阻

E. 完全性高位肠梗阻

方正医学网答案：C

35. 男，72 岁，反酸，胃灼热 30 年。近日呼吸困难，乏力 2 个月。间断口服质子泵抑制剂

治疗，起初有效，近 2 个月效果不佳。胃镜检查示：食管下段及贲门区隆起溃疡性病变，质脆，易出血。最有可能的活组织检查为

A.淋巴癌
B.神经内分泌肿瘤
C.胃肠间质瘤
D.腺癌
E.鳞癌
方正医学网答案：D

36.女，28 岁。左上肢不慎被开水烫伤 1 小时。疼痛明显。查体：左前臂约患者手掌大小皮肤红肿明显，有大小不一水疱，水疱破裂，创面污染较重，关于患者的治疗正确的是

A.抽去水疱液，消毒包扎
B.去除水疱皮，消毒包扎
C.注射破伤风类毒素
D.创面周围注射止痛药物
E.消毒后局部加压包扎
方正医学网答案：B

37.女，20 岁，左乳房红肿、增大 1 个月，进展较快，无疼痛、发热。查体：左乳房红肿，局部温度略高，发硬，但未触及包块，左腋窝有肿大淋巴结，稍硬，活动度好，无压痛。血常规正常。最可能的诊断是

A.急性乳腺炎
B.乳腺增生症
C.导管内乳头状瘤
D.乳房结核
E.炎性乳腺癌
方正医学网答案：E

38.以下不是有机磷农药中毒的毒蕈碱样作用的是

A.肌肉强直性痉挛
B.心血管活动受抑制
C.瞳孔括约肌、睫状肌兴奋
D.消化道、呼吸道腺体兴奋
E.支气管、胃肠道平滑肌兴奋
方正医学网答案：A

39.男，28 岁，右大腿清创缝合术后 6 天，发热，局部伤口红肿，范围较大，疼痛明显。伤口局部见稀薄脓液，淡红色，量多，无腥味。最可能感染的致病菌是

A.大肠埃希菌
B.铜绿假单胞菌
C.溶血性链球菌
D.金黄色葡萄球菌
E.无芽孢厌氧菌
方正医学网答案：C

40.女 43 岁，既往肺结核病史经规范治疗后痊愈。4 天前出现发热伴咳嗽咳痰，当地医院怀疑肺结核复发，予以口服利福平治疗，3 天前出现全身肌肉及腰部酸痛，尿蛋白++，红细胞++，白细胞++，超声示双肾轻微肿大，实质性回声增强，最可能发生的是
A.急性肾小球肾炎
B.急性肾盂肾炎
C.慢性肾小球肾炎
D.急性间质性肾炎
E.泌尿系结核
方正医学网答案：D

41.女性，62 岁，左腰痛伴发热 5 天，最高体温 39.2℃，抗生素治疗体温无明显下降，左肾区叩击痛，心率 102 次/分，血压 110/75mmHg。血常规：白细胞 15.3×10^9/L，N0.85，尿沉渣：白细胞满视野，RBC3～5/HP。泌尿 CT 平扫：左肾扩张积水，左输尿管上段 1.2cm 结石，下一步治疗措施是
A.体外冲击波碎石
B.输尿管镜取石
C.尿道逆行置管术
D.膀胱输尿管镜取石
E.经皮肾镜取石
方正医学网答案：C

42.男，59 岁。发现右侧阴囊内肿物 5 年，逐渐增大。肿物呈球形，表面光滑，有囊性感，无压痛，触不到睾丸和附睾。透光试验（+）。B 超示液性暗区。平卧后肿物无消失或缩小。最可能的诊断是
A.睾丸鞘膜积液
B.附睾炎
C.腹股沟斜疝
D.睾丸肿瘤
E.精索囊肿
方正医学网答案：A

43.女，42 岁。腰腿痛 2 个月。查体：下腰椎旁压痛，左下肢直腿抬高试验阳性（50°），加强试验阳性，外踝及足背外侧皮肤感觉减弱，踝反射消失，考虑为腰椎间盘突出症，最可能累及的神经根是

A.L_4　　B.L_5

C.S_1　　D.L_1

E.L_2

方正医学网答案：C

44.女，78 岁。跌倒右髋受伤 2 小时，局部疼痛，活动受限，患肢缩短，轴向叩击痛（+），X 线片显示右股骨颈基底部骨皮质连续性中断，断段嵌插，Pauwels 角 25°，一般状态差，既往高血压，肺心病，糖尿病病史 30 余年，心功能 IV 级，最佳治疗方案是

A.闭合复位内固定

B.切开复位内固定

C.下肢中立位皮牵引 6～8 周

D.转子间截骨矫正力线

E.人工关节置换术

方正医学网答案：C

45.女，66 岁。2 小时前跌倒时手掌着地受伤。查体：右腕明显肿胀，压痛（+），侧面观呈“银叉样”畸形。最可能的诊断是

A.Galeazzi 骨折

B.Colles 骨折

C.Chance 骨折

D.Monteggia 骨折

E.Smith 骨折

方正医学网答案：B

46.女，30 岁。反复发作性呼吸困难，胸闷 2 年，3 天前受凉后咳嗽咳少量脓痰，接着出现呼吸困难、胸闷，并逐渐加重。查体：无发绀，双肺广泛哮鸣音，肺底部少许湿啰音。表明气道阻塞具有可逆性的检查结果是

A.支气管舒张试验阴性

B.最大呼气流量（PEF）＞60%预计值

C.吸入沙丁胺醇后 FEV_1 增加率＞12%

D.吸入倍氯米松后 FEV_1 增加率

＞12%
E.一秒钟用力呼气容积（FEV_1）＞60%预计值
方正医学网答案：C

47.女，35 岁。支气管哮喘史 20 年，近 2 周来出现活动耐力下降。有时夜间憋醒，口服“氨茶碱”可逐渐缓解。查体：双肺散在哮鸣音。最重要的治疗措施是规律使用
A.糖皮质激素气雾剂
B.长效 β_2 受体激动剂
C.短效 β_2 受体激动剂
D.胆碱能受体抑制剂
E.联合吸入糖皮质激素和长效 β_2 受体激动剂
方正医学网答案：E

48.男，35 岁。2 周前发热、咳嗽咳黄痰，经抗炎治疗后好转。现再次高热、咳嗽胸闷。查体：T39.5℃，115 次/min，R24 次/min，气管右移，左侧语颤减弱，叩诊肺实音，呼吸音消失。血常规显示 WBC23×10^9/L。最有效的治疗措施是
A.胸腔闭式引流
B.胸腔成形术
C.胸膜剥脱术
D.胸腔内注入抗生素
E.静脉点滴广谱抗生素
方正医学网答案：A

49.男，55 岁。持续胸痛 10h 收入院。查体：BP 120/80mmHg，高枕卧位，双肺可闻及较多细湿啰音，啰音范围大于 1/2 肺野。心电图示 V_2～V_4 导联 ST 段抬高 0.2～0.4mV。心功能分级是
A.NYHAⅡ级　B.NYHAⅢ级
C.KillipⅠ级　D.KillipⅣ级
E.KillipⅢ级
方正医学网答案：E

50.男，65 岁。4h 前情绪激动后突然极度气急，咳白色泡沫痰，伴大汗，不能平卧，既往高血压病史 15 年，无慢性支气管炎病史。查体：BP200/120 mmHg，神志清。表情焦虑，口唇发绀，双肺可闻及喘鸣音及湿啰音，心率 100 次/min，律

齐，未闻及杂音。该患者抢救措施不正确的是
A.皮下注射吗啡
B.口服美托洛尔
C.取坐位、吸氧
D.静脉注射呋塞米
E.静脉注射硝普钠
方正医学网答案：B

51.男，72 岁。高血压病史 1 年，血压波动于 170～190/60～65mmHg。查体未见明显异常。实验室检查：血常规、尿常规、肾功能、空腹血糖、血脂等正常。该患者的收缩压控制目标值至少低于
A.140mmHg　　B.170mmHg
C.130mmHg　　D.150mmHg
E.160mmHg
方正医学网答案：D

52.男，65 岁。活动时心前区闷痛 2 年，加重 3 天，休息 3～5 分钟后缓解，每天发作 1～2 次。近 3 天症状加重，每天发作 3～4 次，每次发作持续时间 15～20 分钟。2 年来规律服用阿司匹林和单硝酸异山梨酯。糖尿病病史 8 年，吸烟 20 余年。血总胆固醇 6.5mmol/L，肌钙蛋白 I 正常，心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段下斜型压低 0.3mV。就目前临床资料，最可能诊断是
A.恶化型心绞痛
B.静息型心绞痛
C.变异型心绞痛
D.初发型心绞痛
E.非 ST 段抬高型心肌梗死
方正医学网答案：A

53.男，70 岁，3 小时前突发胸骨后剧烈疼痛，伴出汗乏力，口服硝酸甘油无显著缓解。查体：BP 140/70mmHg，双肺未闻及啰音，HR90 次/分，未闻及杂音。心电图显示 V_1～V_5导联 ST 弓背向上抬高 0.3～0.5mV。为进行心肌再灌注，应选用的药物是
A.美托洛尔　　B.阿托伐他汀
C.阿替普酶　　D.阿司匹林
E.瑞洛普利
方正医学网答案：C

54.男，32 岁。活动后心悸、胸痛喘息 2 月余。其兄 24 岁时猝死。查体：P78 次/min，BP105/75 mmHg，双肺呼吸音清，胸骨左缘第 4 肋间可闻及 3/6 级收缩期喷射样杂音。胸部 X 线片示心脏外形大致正常。最可能的诊断是

A.风湿性心脏瓣膜病

B.房间隔缺损

C.肥厚型心肌病

D.限制型心肌病

E.冠心病

方正医学网答案：C

55.男，30 岁。外伤性脾破裂切除术后 3d。查体：BP106/68mmHg，中心静脉压 18cmH_2O。此时应采取的治疗措施是

A.充分补液　　B.舒张血管

C.收缩血管　　D.适当补液

E.利尿

方正医学网答案：B

56.女，69 岁。突发右小腿疼痛麻木肿胀 3 天。2 周前因右大腿骨折行手术治疗。查体：右大腿无疼痛麻木肿胀，右小腿麻木疼痛肿胀，Homans 征(+)。可能的原因是

A.大隐静脉血栓

B.小腿双静脉血栓

C.小腿深静脉血栓

D.股静脉血栓

E.大腿深静脉血栓

方正医学网答案：C

57.执业：女，20 岁。面色苍白、乏力、心悸 1 周。实验室检查：Hb65g/L，WBC9.4×10^9/L，Plt 212×10^9/L，网织红细胞 0.12，Coombs 试验阳性。首选的治疗措施是

A.输注红细胞

B.应用环孢素 A

C.应用硫唑嘌呤

D.脾切除

E.应用糖皮质激素

方正医学网答案：E

58.女，29 岁。1 月以来乏力、发热伴牙龈肿胀出血。血象检查：Hb65g/L，WBC3.0×10^9/L，分类见原始细胞 30%，Plt 35

×10^9/L。骨髓检查原始细胞 80%，POX 染色部分呈弱阳性，非特异性酯酶染色阳性，NaF 可抑制。最可能的 FAB 分型是

A. M_1 型　　B. M_2 型

C. M_3 型　　D. M_4 型

E. M_5 型

方正医学网答案：E

59. 男，40 岁。无痛性双侧颈部淋巴结进行性肿大伴发热半月，体温最高 37.5℃，无盗汗，体重无明显变化。查体：双侧颈部各触及一个 2cm×2cm 淋巴结，左腋窝一个 2cm×1cm 淋巴结，活动，无压痛，腹软，肝脾肋下未触及。化验：Hb 126g/L，WBC5.3×10^9/L，Plt 155×10^9/L。胸腹部 CT 未见明显淋巴结肿大。右颈部淋巴结活检为弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。本例最可能的分期是

A. Ⅰ期　　B. Ⅱ A 期

C. ⅡB 期　　D. Ⅲ期

E. Ⅳ期

方正医学网答案：B

60. 女，30 岁。体重 45kg，因外伤引起急性失血约 600mL，手术治疗后出血停止。术后 1 天查体：P85 次/min，BP95/60mmHg。化验 Hb105g/L。患者要求输血，应采取的正确措施是

A. 输注新鲜冰冻血浆 400mL

B. 无需输注血液或血液制品

C. 输注全血 200mL

D. 输注普通冰冻血浆 400mL

E. 输注人血蛋白 4g

方正医学网答案：B

61. 女，35 岁。颈前包块 8 年，心慌气短、怕热多汗半年。查体：P110 次/min，BP160/70mmHg，无突眼，甲状腺触及多个结节，中等硬度，表面光滑，随吞咽可上下移动。实验室检查：T_3、T_4 增高，TSH 降低，TPOAb 阴性。最可能诊断是

A. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎

B. 结节性甲状腺肿继发甲亢

C. 甲状腺自主高功能腺癌

D. 单纯性甲状腺肿

E. 原发性甲状腺功能亢进症

方正医学网答案：B

62.女，40 岁。用胰岛素治疗，夜间血糖正常，晨起血糖升高。晨起血糖升高的主要原因为
A.胰岛素拮抗
B.黎明现象
C.Somogyi 现象
D.1 型糖尿病
E.2 型糖尿病
方正医学网答案：B

63.女，48 岁，多关节肿痛 3 年余，累及双手指间关节炎和双腕、双膝及足趾关节。曾普查 RF 阳性，未继续诊治。对明确诊断特异性最强的是
A.HLA-B27 阳性
B.C 反应蛋白升高
C.血尿酸升高
D.抗环瓜氨酸肽抗体阳性
E.血沉升高
方正医学网答案：D

64.男，70 岁。双手指间关节疼痛 2 年，每日晨僵数分钟。查体：T36.6℃，P70 次/分，R18 次/分，BP100/70mmHg，皮肤未见皮疹，心肺腹未见异常，双手远端指间关节 Heberden 结节，双手近端指间关节骨性膨大。血沉正常，ASO(-)，RF(-)。可选择的一线治疗药物是
A.青霉素　　B.秋水仙碱
C.柳氮磺吡啶　D.双氯芬酸钠
E.甲氨蝶呤
方正医学网答案：D

65.女，35 岁。发热 10 天，体温 37.9℃,周身不适，乏力。2 天后体温恢复正常，但乏力加重，尿色变黄，伴食欲不振，腹胀。既往无肝炎病史。实验室检查：ALT 1008U/L, TBIL 87μmol/L，HBsAg(+)，HBeAg(+)，抗 HBcIgM(+)。抗 HAVIgG(+)，抗 HAVIgM(-)。最可能的诊断是
A.病毒性肝炎，甲乙型病毒混合感染，急性黄疸型
B.病毒性肝炎，乙型，急性黄疸型，HAV 既往感染
C.病毒性肝炎，乙型，急性黄疸型，HAV 携带者
D.病毒性肝炎，甲型，急性黄疸型，HBV 携带者

E.病毒性肝炎，甲型，急性黄疸型，HBV 既往感染
方正医学网答案：B

66.男，7 岁。发热头痛、恶心呕吐 2d,嗜睡 1d。查体:T39.5℃，浅昏迷，瞳孔等大，对光反射存在，腹部可见多个出血点，颈抵抗（+），克氏征（+）。实验室检查：血 WBC19×10^9/L，N0.85。最可能诊断是
A.结核性脑膜炎
B.流行性脑脊髓膜炎
C.流行性乙型脑炎
D.中毒型细菌性痢疾
E.肾综合征出血热
方正医学网答案：B

67.女，27 岁，不洁性交史，分泌物呈浆液性。吉萨姆染色可见包涵体。初步诊断为
A.淋病性阴道炎
B.细菌性阴道炎
C.真菌性阴道炎
D.沙眼衣原体
E.滴虫性阴道炎
方正医学网答案：D

68.男，30 岁。晨起四肢无力 1 周，大小便正常。病前 1 周有“上感”史。查体：双眼闭合无力，双侧咽反射迟钝，四肢肌力 1～2 级，肌张力低，腱反射消失，无明显感觉障碍。最可能的诊断是
A.多发性肌炎
B.重症肌无力
C.吉兰-巴雷综合征
D.周期性瘫痪
E.急性脊髓炎
方正医学网答案：C

69.患者，男性，车祸伤及头部，伤后出现左侧鼻唇沟变浅，鼻出血，左耳听力下降，左外耳道流出淡血性液体。诊断首先考虑
A.颅前窝骨折　B.颅中窝骨折
C.颅后窝骨折　D.左颞骨骨折
E.脑震荡
方正医学网答案：B

70.女，67 岁。车祸后即昏迷，伤后 2h 被送往医院。查体：昏

迷状态，左顶枕部有一直径 4cm 头皮血肿，右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高，病理反射阳性。头颅 CT 示右额颞部骨板下新月形高密度影。该患者最可能的诊断是

A.右额颞急性硬脑膜下积液，脑疝

B.右额颞急性硬脑膜外血肿，脑疝

C.右额颞颅内血肿，脑疝

D.右额颞脑挫伤，脑疝

E.右额颞急性硬脑膜下血肿，脑疝

方正医学网答案：E

71.60 岁妇女，因枕部疼痛就诊，X 线显示第四脑室有压迫现象。某日突然患者出现意识丧失，呼吸停止。应首先考虑的情况是

A.右脑颞叶钩回疝

B.左侧颞叶钩回疝

C.大脑镰下疝

D.小脑扁桃体疝

E.小脑幕切迹疝

方正医学网答案：D

72.男，36 岁。3 年内抽搐发作 20 余次，发作表现为无诱因的口角和右上肢抽搐，意识尚清，但不能对答，约 5～10s 后意识丧失伴全身抽搐。持续 30s 后，逐渐停止。事后不能回忆发作过程。发作间期的神经系统检查和常规脑电图检查未见异常。针对该患者的治疗首选药物是

A.氯硝西泮

B.苯妥英钠

C.苯巴比妥

D.乙琥胺

E.卡马西平

方正医学网答案：E

73.男，71 岁。进行性右手震颤、动作缓慢 3 年，翻身困难 1 年。查体：面具脸，右手静止性震颤，四肢肌张力增高，行走缓慢。有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是

A.安坦

B.复方左旋多巴

C.丙炔苯丙胺(司来吉兰)

D.金刚烷胺
E.溴隐亭
方正医学网答案：B

74.男，35 岁。医生询问他工作情况时，患者回答：“工作嘛，就是每天去单位，有时候会遇到交通堵塞，天气不好的时候更麻烦，我家旁边有个公园，里面的花开得挺好看的，还有人在那里遛狗。” 该患者的思维障碍最可能是
A.思维奔逸
B.思维破裂
C.思维散漫
D.思维贫乏
E.思维迟缓
方正医学网答案：C

75.患者，男，68 岁。2 年前出现过短暂的意识混浊，清醒后有几天听到空中有人在向他打招呼，思维迟缓，情感脆弱，几周后症状明显减轻。近半年来类似症状发作过 2 次，记忆力明显减退。头颅 MRI 示大脑多发性腔隙性梗死。最可能的诊断是
A.精神分裂症
B.血管性痴呆
C.癫痫所致精神障碍
D.阿尔茨海默病
E.抑郁发作
方正医学网答案：B

76.男，18 岁。近一年来对家人亲友变得冷淡，不去上学，不洗澡，不主动更换衣服，对与自己有关的各种事情表现的无动于衷。最可能的诊断是精神分裂症
A.偏执型
B.单纯型
C.紧张型
D.青春型
E.混合型
方正医学网答案：B

77.女，25 岁，2 年来常在遇到不高兴的事情时，生气哭闹，出现四肢强直和抽搐样表现，发作时能听清楚家人的呼唤，不语，流眼泪，无唇舌咬伤和大小便失禁，本次因再次出现

类似发作就诊，入院查体，呼之不应，不时四肢抽搐样发作，瞳孔无散大，对光反射存在，可能诊断
A.分离(转换）障碍
B.恐惧性焦虑障碍
C.原发性癫痫
D.抑郁障碍
E.创伤后应激障碍
方正医学网答案：A

78.女，17 岁，总觉得自己胖，想尽一切办法减肥。比如说控制饮食,催吐,运动。身高 165cm，体重 45kg，BMI=15。下列诊断正确的
A.神经性厌食症
B.广泛焦虑障碍
C.减肥药物所致障碍
D.抑郁障碍
E.分离障碍
方正医学网答案：A

79.欲用统计图比较 1994～2003 年城市和农村 3 岁以下儿童贫血患病率的变化趋势，选用何种统计图为合适
A.条图
B.线图
C.圆图
D.直方图
E.散点图
方正医学网答案：B

80.男,45 岁。因反复咳嗽一个月到社区卫生服务中心就诊。医生与其交谈得知该患者已经吸烟 20 多年。年前曾经尝试戒烟一个月并得到家人的支持和鼓励。家人对其的戒烟督促属于影响行为的
A.倾向因素
B.促成因素
C.强化因素
D.内在因素
E.诱导因素
方正医学网答案：C

81.患者，女，23 岁。食用自家腌制的酱豆腐后出现胸闷、呼吸困难、头晕，伴有恶心、呕吐，血压 75/40mmHg，皮肤黏膜呈青紫色。应考虑为
A.亚硝酸盐食物中毒

B.沙门菌食物中毒
C.副溶血性弧菌食物中毒
D.葡萄球菌肠毒素食物中毒
E.肉毒梭菌毒素食物中毒
方正医学网答案：A

82.男,喜欢喝酒，家人为了给他戒酒，在酒里下了戒酒药,使酗酒者饮用后痛苦的恶心呕吐抵消了饮酒的欣快感,从而促使其戒酒,这种方法属于
A.系统脱敏
B.冲击疗法
C.厌恶疗法
D.暗示疗法
E.代币疗法
方正医学网答案：C

83.医生告知某患者患有糖尿病并且让其接受药物治疗，但该患者并不相信自己患病，未听从医生的医嘱服药而是继续上班，该患者的角色行为类型属于
A.角色行为转化
B.角色行为缺如
C.角色行为强化
D.角色行为异常
E.角色行为冲突
方正医学网答案：B

84.患者有损害，不属于推定医疗机构有过错的情形是
A.隐匿有关病历资料的
B.伪造、篡改或销毁病历资料
C.拒绝提供有关病历资料的
D.医疗事故造成患者死亡的
E.违反有关诊疗规范规定的
方正医学网答案：D

85.某公司生产一批中药饮片，说明书功效与省级标准不符合，该药属于
A.超说明书用药
B.假药
C.劣药
D.新药
E.合格药
方正医学网答案：B

86.在医院中，所有医务人员的一切诊疗活动，都以救死扶伤、防病治病，为人民的健康服务为宗旨，需要服从协调，说明

医务人员之间的关系具有
A.协作性
B.同一性
C.平等性
D.竞争性
E.合作性
方正医学网答案：B

87.下列各项中，不符合脑死亡诊断标准的是
A.自主的肌肉运动和自主呼吸消失
B.对外部的刺激和内部的需要无接受性和反应性
C.体温低于 32.2℃或服用中枢抑制药物者除外，脑干反射消失
D.脑电波平直或等电位
E.心跳停止
方正医学网答案：E

88.侵蚀性葡萄胎与葡萄胎病理的主要区别点是
A.绒毛细胞滋养层细胞
B.线毛合体滋养层细胞增生
C.子宫深肌层见水泡状绒毛
D.绒毛间质血管消失
E.绒毛水肿呈水泡状
方正医学网答案：C

89.女，16 岁。低热伴乏力、纳差、恶心、呕吐 3d，来诊当日发现巩膜黄染、实验室检查：ALT860U/L，TBil120μmol/L。出生时曾注射乙肝疫苗。本病的病理特点不包括
A.假小叶形成
B.肝细胞气球样变性
C.肝细胞点状坏死
D.炎症细胞浸润
E.毛细胆管内胆栓形成
方正医学网答案：A

90.女，46 岁，上腹部不适 1 年，加重伴头晕，乏力 2 月，多为进餐前疼痛，既往患有桥本甲状腺炎病史 10 年，胃镜见胃黏膜变薄，黏膜色泽变淡，可透见血管型。最可能出现的胃病类型是
A.A 型胃炎
B.B 型胃炎
C.穿透性胃溃疡
D.慢性浅表性胃炎

E.胃癌
方正医学网答案：A

91.女，56 岁，反复心前区闷痛 2 年，均于劳累时发作，持续约数分钟，休息后缓解，高血压病史五年，发作时 V_1～V_5 导联 ST 段压低，对该患者预后最有价值的药物是
A.曲美他嗪
B.硝酸甘油
C.阿托伐他汀钙
D.氨氯地平
E.地尔硫卓
方正医学网答案：C

92.女，20 岁。低热、干咳 1 个月。既往曾患视神经炎。胸部 X 线片示右肺上叶斑片影。痰涂片抗酸染色阳性。治疗上应避免使用的药物是
A.异烟肼
B.利福平
C.吡嗪酰胺
D.乙胺丁醇
E.链霉素
方正医学网答案：D

93.女，66 岁。乏力 1 个月。高血压病史 4 年。查体：BP 150/70mmHg，P67 次/分，律齐。腹软，腹部未闻及血管杂音。实验室检查：血钾 2.9mmol/L，血肾素水平降低，醛固酮水平升高。CT 示左侧肾上腺增生。该患者的最适宜降压药物是
A.氢氯噻嗪
B.美托洛尔
C.呋塞米
D.螺内酯
E.普萘洛尔
方正医学网答案：D

94.心动周期中，在下列哪个时期左心室内压力最高
A.心房收缩期末
B.等容收缩期末
C.心室收缩期末
D.快速充盈期末
E.快速射血期末
方正医学网答案：E

95.某女中学生，在晚上遭遇一条白犬，当时十分恐惧，表现

出心率加快、血压增高、呼吸加速和肌张力增强，这些生理反应说明活动增强的神经内分泌系统是

A.下丘脑垂体-甲状腺轴

B.下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴

C.交感-肾上腺髓质轴

D.下丘脑-垂体-性腺轴

E.下丘脑-神经垂体轴系

方正医学网答案：C

96.男，65 岁。间断腹胀、上腹隐痛 25 年。胃镜检查提示：胃体黏膜变薄，血管透见，皱襞稀疏，患者可能缺乏的维生素是

A.维生素 B_{12}

B.维生素 C

C.维生素 B_2

D.维生素 B_4

E.维生素 D

方正医学网答案：A

97.男，58 岁。胃部不适伴反酸 20 年，近 1 周来腹胀、恶心、呕吐，吐出大量宿食，每天 1～2 次。查体：呼吸浅，17 次/min，血压正常。上腹部可见胃型，轻压痛。测血 K^+3.0mmol/L，Na^+130mmol/L，Cl^-90mmol/L，CO_2 CP45mmol/L。该患者的酸碱平衡失调的类型是

A.呼吸性碱中毒

B.呼吸性酸中毒

C.代谢性酸中毒

D.呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒

E.代谢性碱中毒

方正医学网答案：E

98.患者，女，48 岁，因为车祸入急诊室，反应迟钝，面色苍白，唇发绀，四肢湿冷，出冷汗，脉搏为 121 次/min，血压为 76/35mmHg。患者的休克可能处于

A.微循环缺血期

B.休克代偿期

C.微循环淤血期

D.微循环衰竭期

E.微循环难治期

方正医学网答案：C

99.下列各项中，哪一项最确切

地说明了脏与腑的区别
A.实质性器官与空腔性器官
B.实而不满与满而不实
C.化生贮藏精气与受盛传化水谷
D.与水谷直接接触与不直接接触
E.经络属表、属阳与属里、属阴
方正医学网答案：C

100.阴寒内盛，血行瘀滞的舌象表现是
A.舌淡红润泽
B.舌红绛少苔
C.舌绛紫而干
D.舌淡白光莹
E.舌淡紫湿润
方正医学网答案：E